

# NEUMOSUIN

## Vaccin inactivat împotriva pleuropneumoniei porcine

NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 AMER (Girona) SPANIA

Tel: +34 972 430660, Fax: +34 972 430661

### DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE:

#### Ingrediente active/doză

*Actinobacillus pleuropneumoniae* inactivat, serotipurile 2, 4 și 5.

A. serotip 2 MAT  $\geq 1/16$  ( $\geq 4 \times 10^9$  microorg.)

A. serotip 4 MAT  $\geq 1/16$  ( $\geq 4 \times 10^9$  microorg.)

A. serotip 5 MAT  $\geq 1/16$  ( $\geq 4 \times 10^9$  microorg.)

### INDICAȚIE (INDICAȚII):

Porcine: prevenirea pneumoniei și pleuropneumoniei produse de *A. pleuropneumoniae*.

### CONTRAINDICAȚII:

Nu se vaccinează porcii bolnavi.

### REAȚII ADVERSE:

Sporadic, la unele animale poate apărea o reacție anafilactică. În asemenea caz se va administra un tratament adecvat.

### SPECII ȚINTĂ:

Porcine.

### POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE:

Porci: 2 ml/animal, indiferent de greutate, vârstă sau sex.

Metodă de administrare: Injecție intramusculară profundă, în musculatură gâtului din spatele bazei urechii.

În general se recomandă următorul program de vaccinare:

#### Ferme de reproducție:

Scroafe: se vaccinează cu 40-45 de zile înainte de a fâta, și se revaccinează 21 de zile mai târziu (cu 20-25 de zile înainte de a fâta). Revaccinarea se face cu aproximativ o lună înainte de următoarea fătare.

Vieri: se vaccinează toate animalele, și se revaccinează 21 de zile mai târziu. După aceea se va administra câte o doză la fiecare 6 luni.

Purcei înțărcați: se vaccinează la vârsta de 40-45 de zile și se revaccinează la vârsta de 60-65 de zile.

Porci: se vaccinează toate animalele când ajung în fermă. Se revaccinează 3 săptămâni mai târziu.

### RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ:

- A se agita înainte de utilizare.

- Se recomandă administrarea vaccinului la o temperatură cuprinsă între +15 și +25 °C.

- Pentru administrare trebuie să se folosească seringi și ace sterile.

### TIMP DE AȘTEPTARE:

Zero zile.

### PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

- A se păstra la +2 și +8 °C.

- A se proteja de lumină.

- A se proteja de îngheț.

- A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe etichetă.

- Perioada de valabilitate după desigilarea flaconului: a se utiliza imediat.

### ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE):

Vaccinați numai animalele sănătoase.

Nu există informații valide despre compatibilitatea acestui vaccin utilizat concomitent cu oricare alt produs medicinal veterinar.

În cazul autoinjectării accidentale solicitați sfatul medicului imediat și arătați prospectul sau eticheta produsului.

### PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ:

Orice produs medicinal veterinar sau materialele provenite din acestea trebuie tratate conform legislației locale.

### DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL:

08.06.2011.

### ALTE INFORMAȚII:

Dimensiunea ambalajului:

Flacoane de 100 ml (50 doze).

Dispoziții legale:

A se elibera numai pe bază de prescripție medicală veterinară.



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com